

BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO No 12: CHIKUNGUNYA

Semana: hasta la semana 52

Fecha de Elaboración: 15 de febrero de 2017

30 de noviembre al 31 de diciembre del 2016

Elaborado: Dra. Lizbeth Cerezo

Revisado: Dr. Israel Cedeño

En el 2016 en su totalidad se han estudiado 3545 casos por el virus de Chikungunya de los cuales 11 casos resultaron positivo (6 autóctonos, 5 importados).

Los casos están registrados en diferentes regiones sanitarias. (Ver tabla N°1) y distribuido en diferentes semanas epidemiológicas. (Ver grafico N°1)

La edad con mayor frecuencia fue de 35-49 años (36.4%). (Ver tabla N°2)

El sexo con mayor porcentaje fue el femenino con un 72.7%. (Ver tabla N° 3)

Tabla N°1 Número de casos confirmados de Chikungunya según región de salud y Corregimiento en Panamá, 2016 (sem52)


Región	Corregimiento	Casos	Total
Total		11	
Kuna Yala	Ailigandi	1	2
	Puerto Obaldía	1	
Colón	Cristóbal**	1	1
Coclé	Pocrí	1	1
Metro	Tocumen	1	3
	Pmá. Viejo**	1	
	24 diciembre	1	
P. Norte	Alcalde Díaz	1	1
	Las cumbres*	1	1
Importado	**	2	2

Fuente: Departamento Nacional de epidemiología/MINSA

*casos importado viviendo en esa región sanitaria

**caso importado que no vive en el país

Gráfico N°1.- Número de casos confirmados de Chikungunya por laboratorio según semanas epidemiológicas, República de Panamá, Año 2016 (sem 52).



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología

Tabla N°2 Número y porcentaje de casos confirmados de Chikungunya según Grupo de edad en Panamá, 2016 (sem52)

Grupo de Edad	Casos	%
menor de 1	0	0.0
1-4	0	0.0
5-9	1	9.1
10-14	1	9.1
15-19	0	0.0
20-24	1	9.1
25-34	2	18.2
35-49	4	36.4
50-59	2	18.2
60-64	0	0.0
65+	0	0.0
Total	11	100.0

Fuente: Departamento Nacional de epidemiología/MINSA

Tabla N°3 Número y porcentaje de casos confirmados de Chikungunya según sexo en Panamá, 2016 (sem52)

Sexo	Casos	%
Masculino	3	27.3
Femenina	8	72.7
Total	11	100.0

Fuente: Departamento Nacional de epidemiología/MINSA

Medidas de Prevención y Control

Mantener el abordaje integral ante un caso sospechoso y la investigación de campo donde se debe realizar búsqueda activa de febriles, aplicación de larvicida y orientación a la comunidad sobre **eliminación de criaderos**.

A la población y a la comunidad en general se les solicita:

1. Tomar al menos 5 minutos diarios para revisión y eliminación de criaderos en su vivienda (escurridor platos, debajo del fregador, canales de techo, bebedero de animales, tanques de almacenaje de agua, platillos, vasos, tinas de lavar, canales de aguas estancadas, plantas acuáticas, entre otros)
2. Limpieza de lotes, piscinas y fuentes
3. Revisión y control de Piscinas y fuentes de agua para evitar que se conviertan en criaderos
4. Tener las Llantas bajo techo
5. Los repelentes contra insectos que contienen DEET, picaridina e IR3535 son seguros para las mujeres embarazadas y las que están amamantando, así como para los niños mayores de 2 meses, si se usan de acuerdo con las instrucciones del producto.
6. No se deben usar productos que contengan aceite de eucalipto o de limón en niños menores de 3 años.
7. Usar mosquiteros al descansar, en las cunas y coches de los bebés.
8. Tener mallas en ventanas y puertas.
9. Cualquier denuncia de criaderos hacerla al 311.

A los viajeros a áreas con casos autóctonos

1. Use camisas de manga larga y pantalones largos.
2. Use repelentes contra insectos registrados en la EPA que contengan DEET, picaridina, aceite de eucalipto limón (OLE por sus siglas en inglés) o IR3535. Siempre utilícelos según las instrucciones.
3. Los repelentes contra insectos que contienen DEET, picaridina e IR3535 son seguros para las mujeres embarazadas y las que están amamantando, así como para los niños mayores de 2 meses si se usan de acuerdo con las instrucciones del producto. No se deben usar productos que contengan aceite de eucalipto de limón en niños menores de 3 años.
4. Use ropa y equipos (como botas, pantalones, medias y carpas) tratados con permetrina.
5. Permanezca y duerma en habitaciones con mosquiteros, mallas en las ventanas y puertas, o aire acondicionado.
6. Al regresar de viaje, si presenta síntomas de alerta (fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular, dolor articular, erupción cutánea, ojos rojos, náuseas, vómitos, diarrea, malestar general) debe acudir a atención médica.



Eliminemos los criaderos